

深圳市福田区疾病预防控制中心文件

福疾控〔2015〕5号

福田区疾控中心关于加强辖区学校、托幼机构 诺如病毒感染性腹泻防控工作的预警

辖区各中小学校、托幼机构：

诺如病毒感染性腹泻是由诺如病毒属引起的腹泻，具有发病急、传播速度快、涉及范围广等特点。诺如病毒可通过被污染的水源、食物、物品、空气等传播，具有高度感染性，人群普遍易感，冬季为病毒性腹泻高发时期。由监测数据显示，从2014年12月起辖区诺如病毒感染性腹泻的聚集疫情较往年有明显上升，为贯彻落实“预防为主”的工作方针，做好我区诺如病毒感染性腹泻疫情的防控工作，现向辖区学校和托幼机构提出以下重点防控措施：

一、加强监测，及时隔离传染源

完善内部的传染病监测防控系统，落实晨检、午检、因病缺勤监测等工作制度。及时掌握老师及学生情况，发现呕吐、腹泻等急性胃肠炎病例异常增多时（3 天超过5 例，或1 周超过10 例）立即报告区疾病预防控制中心。对患者进行隔离治疗，直至症状消失72 小时或凭医院出具相关证明后方可上班（课）。

二、加强通风，落实清洁消毒

保持教室、宿舍良好通风换气；完善洗手设施，配备相应的消毒药物、手部清洁消毒剂；清洁工具要按功能分区配套并专用，防止交叉污染；加强冲水马桶开关、水龙头开关、饮水机、门把手、玩具、扶手等重点物体表面的日常清洁卫生和消毒工作。

做好隔离场所和污染场所的消毒工作。至少由专人或经规范培训的人员每天两次对隔离场所的厕所、床铺、课桌（椅）、门把手等清洁消毒；清理病人呕吐物及粪便时要做好防护，戴口罩和手套，处理完后要及时用肥皂、消毒洗手液等清洁和消毒双手；被患者呕吐物和粪便污染的被服、地板等物体表面以及清洁用具均用含氯消毒液清洗消毒。被污染的衣物也可采用煮沸消毒的方法。

三、深化宣教，培养卫生习惯

加强对师生员工个人卫生、食品安全和健康生活方式的健康教育和宣传教育，养成勤洗手、不喝生水、生熟分开、少吃生食的卫生防病习惯；加强体育锻炼，增强学生体质健康水平；加强

与家长沟通，确保患儿及时就诊、规范隔离传染源。

福田区疾病预防控制中心

2015年1月20日

（联系电话：82034675，13312991436）

公开方式：主动公开

抄送：区卫计局，区教育局，区妇女联合会，市投资控股有限公司
幼教管理中心。

福田区疾病预防控制中心办公室

2015年1月20日印发
